

Первые находки *Mecinus janthinus* Germar, 1821 (Coleoptera, Curculionidae) на Дальнем Востоке России и в Монголии

First records of *Mecinus janthinus* Germar, 1821 (Coleoptera, Curculionidae) from Russian Far East and Mongolia

А.А. Легалов^{*,**,***}, В.В. Дубатовол^{*,****}
А.А. Legalov^{*,**,***}, V.V. Dubatolov^{*,****}

* Институт систематики и экологии животных СО РАН, ул. Фрунзе 11, Новосибирск 630091 Россия. E-mail: fossilweevils@gmail.com; vvdubat@mail.ru.

* Institute of Systematics and Ecology of Animals, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Frunze Str. 11, Novosibirsk 630091 Russia.

** Алтайский государственный университет, ул. Ленина 61, Барнаул 656049 Россия.

** Altai State University, Lenina Str. 61, Barnaul 656049 Russia.

*** Томский государственный университет, пр. Ленина 36, Томск 634050 Россия.

*** Tomsk State University, Lenina Prosp. 36, Tomsk 634050 Russia.

**** ФГУ «Заповедное Приамурье», ул. Юбилейная, 8, Хабаровский край, пос. Бычиха 680502 Россия.

**** Federal State Institution «Zapovednoe Priamurye», Yubileynaya Str. 8, Khabarovsk Krai, Bychikha 680502, Russia.

Ключевые слова: Coleoptera, Curculionoidea, Curculioninae, Mecinini, новые находки, Хабаровский край.

Key words: Coleoptera, Curculionoidea, Curculioninae, Mecinini, new records, Khabarovskii Krai.

Резюме. В статье приводятся первые находки *Mecinus janthinus* Germar, 1821 в Монголии и на Дальнем Востоке России (Хабаровский край).

Abstract. The first records of *Mecinus janthinus* Germar, 1821 from Mongolia and Russian Far East are given.

Введение

Род *Mecinus* Germar, 1821 относится к трибе Mecinini и включает около 50 видов, распространённых в Палеарктике [Caldara, Fogato, 2013; Alonso-Zarazaga et al., 2017]. В азиатской России было известно 6 видов, в том числе два на Дальнем Востоке [Legalov, 2020]. Три вида было отмечено в фауне Монголии [Alonso-Zarazaga et al., 2017].

Материал и методы

Изученный материал хранится в коллекциях Института систематики и экологии животных СО РАН (Новосибирск) — ИСиЭЖ и Зоологического института РАН (Санкт-Петербург) — ЗИИ.

Coleoptera

Curculionidae: Curculioninae: Mecinini

Mecinus Germar, 1821

Mecinus janthinus Germar, 1821

Рис. 1.

Материал. Россия: Хабаровский край, Большехехцирский заповедник, окр. кордона Чирки, 48°11–12' N, 134°40–41' E, 5.VI.2019, В.В. Дубатовол — 1♀ (ИСИЭЖ);

Монголия: Восточный аймак, 60 км ВСВ Баян-Бурда, г. Держин-Цаган-Обо, 46,8° N, 118,3° E, 12.VI.1976, И.М. Кержнер — 1♀ (ЗИИ).

Material. Russia: Khabarovskii Krai, Bolshekhkhtsirsky Nature Reserve, near Chirki, 48°11–12' N, 134°40–41' E, 5.VI.2019, V.V. Dubatolov — 1♀; Mongolia: Dornod Province, 60 km ENE Bayan-Burda, Derhin-Tsagan-Obo Mts., 46.8° N, 118.3° E, 12.VI.1976, I.M. Kerzhner — 1♀.

Замечания. Вид связан с различными видами льянок [Smreczyński, 1972; Toševski et al., 2011].

Распространение. Европа, Турция, Армения, Сибирь [Alonso-Zarazaga et al., 2017]. На восток был известен до Иркутска [Legalov, 2020]. В статье приводятся первая находка *Mecinus janthinus* в Монголии и самая восточная находка (Хабаровский край) этого вида (рис. 1).

Благодарности

Авторы благодарят Б.А. Коротяева (Санкт-Петербург) за возможность изучения коллекции ЗИИ по роду *Mecinus*.

References

- Alonso-Zarazaga M.A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlavá P., Korotyaev B., Lyal C.H.C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Sánchez-Ruiz M., Sforzi A., Silfverberg H., Skuhrovec J., Trizna M., Velázquez de Castro A.J., Yunakov N.N. 2017. Cooperative catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea // Monografias electrónicas. Vol.8. P.1–729.
- Caldara R., Fogato V. 2013. Systematics of the weevil genus *Mecinus* Germar, 1821 (Coleoptera: Curculionidae). I. Taxonomic treatment of the species // Zootaxa. Vol.3654. No.1. P.1–105.




Рис. 1. Распространение *Mecinus janthinus* в Северной Азии. Красные кружки — новые находки.

Fig. 1. Distribution map of *Mecinus janthinus* from North Asia. Red circles — new localities.

Legalov A.A. 2020. Revised checklist of superfamily Curculionoidea (Coleoptera) from Siberia and the Russian Far East // *Acta Biologica Sibirica*. Vol.6. P.437–549.

Smreczyński S. 1972. Klucze do oznaczania owadów Polski. XIX (98d). Ryjkwce – Curculionidae. Podrodzina – Curculioninae. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 195 p.

Toševski I., Caldara R., Jović J., Hernández-Vera G., Baviera C., Gassman R., Emerson B.C. 2011. Morphological, molecular and biological evidence reveal two cryptic species in *Mecinus janthinus* Germar (Coleoptera, Curculionidae), a successful biological control agent of *Dalmatian toadflax*, *Linaria dalmatica* (Lamiales, Plantaginaceae) // *Systematic Entomology*. Vol.36. No.4. P.741–753.

Поступила в редакцию 15.9.2021